



عنوان	باقی ماندن تامپون در واژن به دنبال سزارین
شرح حادثه	مددجو خانم ۳۵ ساله G2P0Ab1 با سن بارداری 40W+2d با شکایت درد زایمان و post Date در ساعت ۰۴:۳۵ مورخ ۹۷/۱۰/۲۵ به درمانگاه مامایی مراجعه نموده است. NST نرمال بوده پس از انجام اقدامات درمانی لازم بیمار جهت زایمان طبیعی آماده شده و در ساعت ۱۴:۳۰ بیمار فول آرست شده است. FHR مرتباً چک شده و در ساعت ۱۶:۱۰ FHR اُفت پیدا کرده و تا ساعت ۱۶:۴۰ ادامه دار بوده است. توسط متخصص زنان ویزیت و معاینه گردیده و جهت سزارین آماده شده است و در ساعت ۱۷:۰۵ نوزاد با آپگار ۹/۱۰-۷ متولد شد. بیمار در ریکاوری دچار خونریزی واژینال شده است که ماساژ دو دستی داده شده و پس از اقدامات دارویی و استفاده از بالون بکری در رحم، ۲ عدد گاز در داخل واژن گذاشته شد. دو عدد سوچور با نخ کرومیک در واژن به علت خونریزی و لسراسیون زده شد و بیمار به ICU منتقل شد. بیمار در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۸ با حال عمومی خوب ترخیص شد. مددجو در تاریخ ۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۲:۱۰ با شکایت یک جسم خارجی در بدن و بوی بد به درمانگاه مامایی مراجعه نموده و چک شده است. تب و تاقیکاردی ندارد. در معاینه واژینال ۲ عدد گاز در سرویکس و واژن با بوی بد خارج شد. وضعیت به اطلاع پزشک آنکال رسید و توسط ایشان ویزیت شد. دستور انجام گرافی شکمی را دادند که بعد از انجام و رؤیت آن توسط پزشک و نرمال بودن گرافی، بیمار با دستور آنتی بیوتیک خوراکی ترخیص شد.
علل رویداد حادثه	✓ عدم شمارش گازها جهت فیکس کردن بالون بکری در رحم توسط متخصص زنان ✓ عدم حضور پرسنل اتاق عمل جهت دادن گاز و شمارش صحیح آنها ✓ فراموش کردن خروج گازها از واژن قبل از ترخیص مددجو توسط متخصص زنان ✓ انجام عمل جراحی در زمان تعویض شیفت ✓ عدم تعویض شیفت به شیوه صحیح در اتاق عمل
اقدامات اصلاحی	✓ تذکر به اتاق عمل (در خصوص حضور پرسنل در صورت انجام عمل جراحی در زمان تعویض شیفت) مبنی بر عدم ترک اتاق عمل توسط پرسنل تا زمان حضور شیفت بعد ✓ انجام شمارش گازها پس از اتمام جراحی توسط پزشک و پرستار اتاق عمل، ثبت و مهر توسط پزشک متخصص