



| عنوان            | فوت بیمار به دلیل عدم تشخیص به موقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرح حادثه        | بیمار خانمی 61 ساله با سابقه فشار خون، دیابت و CVA قبلی در تاریخ 99/4/16 با شکایت درد اپیگاستر از روز قبل، در ساعت 7:03 به بیمارستان مراجعه می نماید. بیمار توسط پزشک درمانگاه در ساعت 07:15 ویزیت و دستور انجام ECG و تزریق آمپول پنتوپرازول داده می شود. ECG بیمار گرفته و آمپول پنتوپرازول جهت بیمار تزریق می گردد. همراه بیمار در ساعت 7:40 با ذکر اینکه بیمارش بدحال می باشد به پرسنل اطلاع داده و سریعاً بر بالین بیمار حاضر شده که مشاهده می شود بیمار گسپینگ دارد. بلافاصله به اتاق احیا منتقل و CPR شروع شده است. بعد از 45 دقیقه احیا متأسفانه بیمار Expire می گردد. |
| علل رویداد حادثه | <p>✓ عدم تشخیص صحیح بیماری</p> <p>✓ عدم تشکیل پرونده جهت بیمار بدحال و درمان سرپایی</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اقدامات اصلاحی   | <p>✓ بیماران بالای 40 سال با درد اپیگاستر باید از نظر مشکلات قلبی و حملات قلبی بررسی دقیق صورت گیرد.</p> <p>✓ در تمام بیماران با درد در ناحیه قفسه سینه و اپیگاستر که حداقل یک ریسک فاکتور داشته باشند اخذ نوار قلب و چک آن و تشکیل پرونده بستری الزامی می باشد.</p> <p>✓ در هیچ شرایطی حتی برای لحظات کوتاه محل تریاژ بدون پرستار نباشد.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |