



عنوان	پارگی پرینه در زایمان طبیعی
شرح حادثه	مددجو خانم ۱۹ ساله با سن حاملگی 40W&4D در تاریخ ۹۸/۰۱/۰۳ در ساعت ۲۱:۴۵ با شکایت درد شکم و خونریزی به زایشگاه مراجعه نموده است. علائم حیاتی چک و معاینات مامایی انجام شد. بیمار بستری گردید و ماساژ درمانی و کیسه آبگرم و تغییر پوزیشن برای بیمار انجام شد. به دلیل کنتراکشن های مناسب برای بیمار اینداکشن شروع نشد و بیمار در ساعت ۰۱:۰۰ به اتاق زایمان منتقل شد و زایمان در حضور متخصص زنان انجام گردید و نوزاد با وزن ۳۰۰۰ گرم به روش NVD/EPI متولد شد. حین تولد نوزاد رأس اپیزیوتومی بالا رفت و ماما جهت ترمیم محل اپیزیوتومی تسلط و مهارت نداشته است و بلافاصله به دکتر صادقی اطلاع داده شد و توسط متخصص زنان رؤیت شد و دستور انتقال بیمار به اتاق را دادند و توسط ایشان ترمیم محل اپیزیوتومی انجام شد و سپس به بخش منتقل و در تاریخ ۹۸/۰۱/۰۷ ترخیص گردید.
علل رویداد حادثه	✓ عدم مهارت ماما در کنترل محل اپیزیوتومی ✓ عدم انجام مانورهای صحیح جهت خروج جنین
اقدامات اصلاحی	✓ برگزاری کلاسهای آموزشی جهت کسب مهارت در رابطه با کنترل پرینه برای کلیه پرسنل ماما جدیدالورود ✓ خودداری از انجام اقدامات تهاجمی مثل فوندال(فشار به بالای فوندوس رحم جهت کمک به نزول جنین)